

Die Vögel des Chiemsees und des Chiemgaus (Stand 2009)

Ausarbeitung: Dr. Michael Lohmann, dr.milo@t-online.de, 15.6.2009, Ergänzungen Februar + Juni 2010

Auswertung von 97.300 Einzelbeobachtungen aus den Jahren 1901-2009:

166 Brutvogelarten + 134 Gastvogelarten + 24 Gefangenschaftsflüchtlinge = 324 Arten

farblich hinterlegte Zeilen : grüner Hintergrund → Brutvögel »166 Arten«, weisser Hintergrund → Gastvögel »134 Arten«,
gelber Hintergrund → Gefangenschaftsflüchtlinge (sicher oder wahrscheinlich aus Gefangenschaft stammende Arten) »24 Arten«

- Spalte **lfd. Nr.** : Die laufende Nummer gibt die systematische Reihenfolge an, da die EURING-Nr. tlw. von dieser Sortierreihenfolge abweicht
- Spalte **EURING-Nr.** : EURING ist eine Koordinationsstelle für wiss. Vogelmarkierungen; jede in Europa festgestellte Vogelart erhält hier eine laufende Nummer.
- Spalte **Status** : BrutV → Brutvogel, BrutG → Brutgast, BP → Brutpaar, DurchZ → Durchzügler, IrrG → Irrgast, MauG → Mausegast, SoG → Sommergast, WiG → Wintergast
- Spalte **Max.** : Tageshöchstwert von einem Ort oder Summe Chiemsee
- Spalte **Beob.** : Zahl der ausgewerteten Beobachtungen
- Spalte **Häufigk.** : Zahl der Jahre mit Beobachtung 1988-2007 (0 = wurde in diesem Zeitraum nicht beobachtet; Höchstwert = 20)
- Spalten Max. bis Häufigk.: Die Zahlen geben einen Hinweis auf die Häufigkeit einer Art, allerdings nicht bei alltäglichen Arten, die kaum notiert werden.
- Spalte **Trend** : Entwicklung seit 1960. ↑ bzw. ↓ → wobei zwischen lang- und kurzfristigen Veränderungen hier nicht unterschieden werden kann; starke Veränderung sind durch ein doppeltes Symbol ↑↑ bzw. ↓↓ gekennzeichnet, † → seit mindestens 20 Jahren im Gebiet nicht mehr brütende Art

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
001	00020	Sterntaucher • <i>Gavia stellata</i>	(fast) regelm. WiG aus N-Europa auf ChS + SimsS: 13.10.-21.6., Max. Jan.-Mrz., im Sommer selten	17	405	19	
002	00030	Prachtaucher • <i>Gavia arctica</i>	regelm. WiG aus N-Europa auf Chiem- + Simssee: in allen Monaten, Max. im Nov., im Sommer selten	19	821	20	
003	00040	Eistaucher • <i>Gavia immer</i>	unregelm. WiG aus Island: 8.11.-18.5., Max.Feb./Mrz., vor 1983 nur 1-mal (früher übersehen?)	2	68	11	
004	00070	Zwergtaucher • <i>Tachybaptus ruficollis</i>	verbr. BrutV, Kleingew. + Buchten: ganzj., ChS-Max.= 130 im Nov., Min. in 1980ern, ChS-BP: 10-15	130	1597	20	
005	00090	Haubentaucher • <i>Podiceps cristatus</i>	verbr. + häufiger BrutV, DurchZ + Gast der Seen: ganzj., Max.im Nov., Min. Ende 1980, ChS-BP: um 50	600	2930	20	
006	00100	Rothalstaucher • <i>Podiceps grisegena</i>	regelm. WiG aus O-Europa: in allen Monaten, Max. Nov.-Feb., Zun. bis Mitte 1980er, seither Abn.	20	575	20	↓
007	00110	Ohrentaucher • <i>Podiceps auritus</i>	regelm. WiG aus NO-Europa: 21.7.-16.5., Max. im Okt./Nov., Zun. bis Mitte 1990er, seither Abn.	9	223	20	↓

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
008	00120	Schwarzhalstaucher • <i>Podiceps nigricollis</i>	BrutV seit etwa 1975, im Winter selten: Max. im Juni, ChS-BP: 10-50	121	1952	20	↑
009	00720	Kormoran • <i>Phalacrocorax carbo</i>	BrutV seit 1994 + DurchZ: in allen Monaten, Max. Juni-Okt., ChS-BP: bis 145 (2001), 70 BP seit 2005	1112	1659	20	↑↑
010	00820	Zwergscharbe • <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Netzfang v. 11.11.1957 als Präparat in Fischereifachschule Starnberg	1	1	0	
011	00919	Pelikan • <i>Pelecanus sp.</i>	1 Ind. 19.8.-15.11.1995 (Weinfurter u.a.)	1	6	1	
012	00950	Rohrdommel • <i>Botaurus stellaris</i>	bis 1960 BrutV oder BrutG, heute WiG (29.8.-21.4.) in wenigen Ind., 1 BP 1993 Kesselsee (A. Hartl)	2	155	19	↓
013	00980	Zwergdommel • <i>Ixobrychus minutus</i>	letzte sichere Bruten 1968, neuerdings wieder Brutverdacht: 1.5.-25.9.	6	60	11	↓
014	01040	Nachtreiher • <i>Nycticorax nycticorax</i>	unregelm. DurchZ/SoG aus S-Europa: 4.4.-14.10., v.a. April-Juni, oft Jungvögel	4	48	12	
015	01080	Rallenreiher • <i>Ardeola ralloides</i>	DurchZ/SoG aus S-Europa: 21.4.-15.8. (1904, 1959, 1975, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007)	1	14	6	↑
016	01110	Kuhreiher • <i>Bubulcus ibis</i>	Irrgast aus S-Europa: 2 Ind. 26.5.1977 SimsS, 2 versch. Ind. 16.5.-5.8.2008 ChS + TinningerS	2	8	1	
017	01180	Küstenreiher • <i>Egretta gularis</i>	1 Ind. 16.9.2006 Hirschauer Bucht (E. Witting)	1	1	1	
018	01190	Seidenreiher • <i>Egretta garzetta</i>	DurchZ/SoG aus S-Europa: 21.4.-13.10., seit 1993 alljährlich, aber in schwankender Häufigkeit	5	178	17	↑
019	01210	Silberreiher • <i>Egretta alba</i>	v.a. WiG aus SO-Europa: seit 1984 alljährlich, starke %% seit 1992, im Sommer wenige	51	1653	20	↑↑
020	01220	Graureiher • <i>Ardea cinerea</i>	BrutV, (DurchZ): ganzjährig, heute wohl nur noch 1 Kolonie mit 10-12 BP + einige Einzelbruten	308	1283	20	↓
021	01240	Purpureiher • <i>Ardea purpurea</i>	BrutG: 1955/56 bis 6 BP im Achendelta, seither DurchZ/SoG, 22.4.-6.10.; 1958-2007 nur in 24 Jahren	24	70	13	
022	01310	Schwarzstorch • <i>Ciconia nigra</i>	BrutV seit 1987: 5.3.-23.11., 2009 im Umkreis von 50 km 6-12 BP (Zuwanderung aus O-Europa)	7	234	19	↑
023	01340	Weißstorch • <i>Ciconia ciconia</i>	BrutG, DurchZ/SoG: Apr.-Sep., ausnahmsw. im Winter, Brut 1968/69 Endorf, Brutversuch 2004 Grabenstätt	40	343	20	↑
024	01360	Sichler • <i>Plegadis falcinellus</i>	sommerl. Irrgast aus Südeuropa: 2 Ind. 31.5.1958 HB (Lo), 1 Ind. 17.-27.9. (N. Thum u.a.)	2	7	1	
025	01400	Waldrapp • <i>Geronticus eremita</i>	1 Ind. 19. U. 26.9.2004 Schönegart + Drathmoos (Langenberg)	1	2	1	
026	01420	Heiliger Ibis • <i>Threskiornis aethiopicus</i>	je 1 Ind. 30.9.-5.11.2001, 18.8.2003, 8.5.-20.7.2004, 27.4. + 13.7.2008, 4.7.2009	1	24	4	
027	01440	Löffler • <i>Platalea leucorodia</i>	seit 1987 DurchZ/SoG aus SO-Europa: 11.5.-13.7. + 27.-29.9.	2	37	10	↑
028	11289	Flamingo • <i>Phoenicurus sp.</i>	in allen Monaten, hauptsächlich Chileflamingos, offenbar aus privater Haltung in Salzburg	3	83	11	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
029	01520	Höckerschwan • <i>Cygnus olor</i>	BrutV, MauserG, WiG: ganzj., Max. Juni-März (Nichtbrüter), hohe Zahlen 1985-1991, seither Max. um 100	382	1545	20	
030	01530	Zwergschwan • <i>Cygnus columbianus</i>	seltener WiG aus Sibirien: 1 Ind. 9.-15.11.1989, 2 Ind. 10.11.2002, 7.5.2003, 26.11.-28.12.2008	2	24	2	
031	01540	Singschwan • <i>Cygnus cygnus</i>	(fast) regelm. WiG der Seen aus NO-Europa: 22.10.-5.4. (1x im Juli), Max. im März	12	423	19	
032	20800	Schwarzschan • <i>Cygnus atratus</i>	je 1 Ind. 1993, 2002-2005 in allen Monaten außer Feb.-Apr.	1	30	5	
033	01560	Schwanengans • <i>Anser cygnoides</i>	erstmal 1979 (Deutsch-Reitinger), in den Jahren 2000-2002 in allen Monaten außer Juni + Okt.	1	24	3	
034	01570	Saatgans • <i>Anser fabalis</i>	nicht alljähr. WiG aus NO-Europa: 16.10.-28.4., Sommerdaten von Gefangenschaftsflüchtlingen?	65	120	18	
035	01590	Blessgans • <i>Anser albifrons</i>	nicht alljähr. WiG aus Sibirien: 24.8.-19.4., Sommerdaten von Gefangenschaftsflüchtlingen?	75	174	17	
036	01610	Graugans • <i>Anser anser</i>	BrutV d. Feuchtgebiete seit 1970ern: ganzjährig, starke %% seit 1985, ChS-BP (2009): 30-50	700	1414	20	↑ ↑
037	01620	Streifengans • <i>Anser indicus</i>	seit 1987 (Hohlt) ganzjährig (Mischbrut mit Graugans?)	10	278	20	
038	01630	Schneegans • <i>Anser caerulescens</i>	2 Ind. 15.9.1974 (Wüst), je 1 Ind. 9.5.1989 (Lo), 27.-28.5.1997 (Hohlt, Holzmann), 23.10.1998 (Hohlt)	2	5	3	
039	01660	Kanadagans • <i>Branta canadensis</i>	verwilderter Parkvogel: ganzjährig, Freilandbruten bisher wohl nur Seeon, Alz und Pelhamer See	40	348	20	↑
040	01670	Weißwangengans • <i>Branta leucopsis</i>	seit 1991 (Masur, Uhlig) in allen Monaten (Mischbruten?)	6	236	16	
041	01680	Ringelgans • <i>Branta bernicla</i>	arktischer IrrG: 2 Ind. 18.11.1901 erlegt, 1 juv. 30.11.-23.12.1996, 1 ad. 19.6.-12.7.2006 (beringt)	2	9	2	
042	01690	Rothalsgans • <i>Branta ruficollis</i>	15.4.-28.5.1997 (Lohmann u.a. mit Protokoll und Foto)	1	5	1	
043	01700	Nilgans • <i>Alopochen aegyptiacus</i>	je 1 Ind. 15.11.1969 (Hohlt) + 13.3.2009 (Pröls, Walter)	1	1	0	
044	01710	Rostgans • <i>Tadorna ferruginea</i>	erstmal 1979, seit 1994 alljährlich in allen Monaten (brütet am Waginger See)	12	258	16	
045	01730	Brandgans • <i>Tadorna tadorna</i>	seit 1973: ganzjährig, v.a. Nov.-Apr., seit 1993 %% (durch Bruten am Unterer Inn?)	40	517	20	↑
046	26660	Graukopfkasarka • <i>Tadorna cana</i>	1 Ind. am 29.10.2009 in Hirschauer Bucht (Beer, Manitz -Fotos)	1	1	-	
047	01780	Mandarinente • <i>Aix galericulata</i>	in allen Monaten außer Juni, Juli, Sep., Okt.	2	23	12	
048	09580	Brautente • <i>Aix sponsa</i>	in allen Monaten	6	34	15	
049	01790	Pfeifente • <i>Anas penelope</i>	regelm., nicht häufiger WiG NO-europ. Küsten: in allen Monaten, Max. März/Apr. + Okt./Nov.	112	762	20	↑

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
050	01820	Schnatterente • <i>Anas strepera</i>	nicht häufiger BrutV, zahlr. MauG/WiG: ganzjährig, Max. Aug.-Dez./Jan., ChS-BP: 5-10? Zun. G seit 1980	643	1773	20	↑
051	01840	Krickente • <i>Anas crecca</i>	verbreiter, nicht häufiger BrutV der Kleingewässer und WiG: ganzjährig, Max. Okt./Nov.	590	1818	20	
052	01860	Stockente • <i>Anas platyrhynchos</i>	verbreiteter + häufiger BrutV: ganzjährig, Max. Nov.-Feb., ChS-BP: 30-50	4434	1580	20	
053	01890	Spießente • <i>Anas acuta</i>	regelm. WiG, vereinz. im Sommer (Ansiedlungsversuche): Sept./Okt.-Mrz./Apr., Max. Okt./Nov.	155	1100	20	↑
054	00000	Chilepfeifente • <i>Anas sibilatrix</i>	1 Ind. 12.10.2004 Hirschauer Bucht (F. Fischer)	1	1	1	
055	00000	Silberente • <i>Anas versicolor</i>	1 Weibchen 31.8.-6.9.2002 (Langenberg)	1	3	1	
056	01900	Bahamaente • <i>Anas bahamensis</i>	4.3.1997 Totfund (Lohmann), 29.9.-13.10.2006 (Langenberg, Masur), 13.9.2008 (Mandl)	1	4	2	
057	01910	Knäkente • <i>Anas querquedula</i>	BrutG + DurchZ, je 1 Brutnachweis 2006 + 2007: Max. März/Apr. + Aug., fehlt Dez./Jan.	91	1027	20	
058	01940	Löffelente • <i>Anas clypeata</i>	DurchZ: Aug-Dez., Max. Nov., vereinzelt Jan.-Juli, %% seit 1991, seit 1986 BrutV, ChS-BP: 0-2	330	1449	20	↑
059	01960	Kolbenente • <i>Netta rufina</i>	BrutV + DurchZ seit 1975: ganzjährig, Max. Okt./Nov., ChS-BP: 0-6; starke Zun. 1976-1991, dann Rückgang	2000	1992	20	
060	01980	Tafelente • <i>Aythya ferina</i>	zahlreicher WiG + DurchZ seit 1970, bisher keine Brut: im Sommer nur vereinzelt, Max. Sep.-Feb.	6380	1692	20	↑
061	02020	Moorente • <i>Aythya nyroca</i>	DurchZ in geringer Zahl, bisher keine Wildbrut durch Ansiedlungsversuche: ganzjährig, Max. Juni-Okt.,	12	225	19	↑
062	02030	Reiherente • <i>Aythya fuligula</i>	zahlreicher WiG + BrutV: ganzjährig, Max. Sep.-Jan., starke %% in den 1970ern, ChS-BP: um 10	16639	2070	20	↑
063	02040	Bergente • <i>Aythya marila</i>	nicht häufiger WiG aus N-Europa: 13.10.-21.4. (1 x Sept.), leichte %% wohl beobachterbedingt	22	343	20	
064	02060	Eiderente • <i>Somateria mollissima</i>	nicht häufiger DurchZ + WiG a.d. nördl. Europa: Max. Sep./Okt., Einzelne in allen Monaten	39	510	19	
065	02110	Kragenente • <i>Histrionicus histrionicus</i>	2 Männchen + 2 Weibchen am 5.1.2006 Feldw. Bucht (Gulden)	4	1	1	
066	02120	Eisente • <i>Clangula hyemalis</i>	seltener WiG aus N-Europa: 9.11.-27.4. (je 1 Ind. 13.5.1989 + 14.-16.9.2006), häufiger in den 1980ern	4	78	14	
067	02130	Trauerente • <i>Melanitta nigra</i>	seltener WiG aus N-Europa: 4.10.-20.2. (5 Ind. 7.4.1988, H. Schaber)	7	38	9	
068	02150	Samtente • <i>Melanitta fusca</i>	regelmäßiger, nicht häufiger WiG aus N-Europa: 12.10.-27.5.	38	525	20	
069	02160	Büffelkopffente • <i>Bucephala albeola</i>	je 1 Männchen 16.10.1999 (Langenberg u.a.), 6.12.08-9.2.09, 1.10.09-31.3.10	1	9	2	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
070	02180	Schellente • <i>Bucephala clangula</i>	regelmäßiger, zahlreicher WiG, seit 1988 BrutV (10-20 BP), 1971-2003 %% der Winterzahlen	2193	1909	20	↑
071	02200	Zwergsäger • <i>Mergus albellus</i>	nicht häufiger WiG: 3.10.-21.5. (1 Ind. 13.-26.8.2001, Holzmann), etwas zahlreicher 1994-2005	23	352	20	
072	02210	Mittelsäger • <i>Mergus serrator</i>	seltener nordischer DurchZ/WiG: 19.10. (2. Ind. 9.9.1990, Uhlig) bis 27.5.	11	123	19	
073	02230	Gänsesäger • <i>Mergus merganser</i>	WiG + seltener BrutV: Max. Dez.-März, ChS-BP: 0-4	102	1980	20	↑
074	02260	Weißkopfruderente • <i>Oxyura leucocephala</i>	mediterraner IrrG oder Gefangenschaftsflüchtling: 1 W 2.-10.11.1991 (M. Weinfurter u.a.)	1	6	1	
075	02250	Schwarzkopfruderente • <i>Oxyura jamaicensis</i>	je 1 Ind. 7.11.1986 (MK), 18.-22.10.1995 (HH), 30.10.-2.11.2003 (MW), 11.10.2008 bis April 2010	1	29	3	
076	02310	Wespenbussard • <i>Pernis apivorus</i>	DurchZ + seltener BrutV der Moore + Hanglaubwälder: Mai + Sep., 1.5.-30.10., (frühere Beob. unsicher)	20	274	20	↓
077	02380	Schwarzmilan • <i>Milvus migrans</i>	DurchZ (April/Mai) + BrutV seit 1995: 4.3.-24.10, ChS-BP (2009): 2-4; %% seit 1993	8	605	20	↑
078	02390	Rotmilan • <i>Milvus milvus</i>	DurchZ + BrutV seit 2007: 2.3.-4.11. (3-mal Dez.-Feb.), ChS-BP (2009): 1-x (weitere jenseits Inn + Traun?)	2	81	18	↑
079	02430	Seeadler • <i>Haliaeetus albicilla</i>	seit 1977 regelm. WiG aus NO-Europa: Anf. Okt. bis Mitte März, Brutvers. 1997, 2000, 2008 (siehe Text S....)	4	913	20	↑
080	02510	Gänsegeier • <i>Gyps fulvus</i>	Irrgast aus S-Europa: 13.9.1992, Jochberg (N. Mieslinger)	1	1	1	
081	02560	Schlangenadler • <i>Circaetus gallicus</i>	Irrgast aus S-Europa: je 1 Ind. 10.5.23006 (F. Wölfl) + 3.6.2007 (M. Weinfurter), Protokolle liegen vor	1	2	2	
082	02600	Rohrweihe • <i>Circus aeruginosus</i>	DurchZ + seltener BrutV größerer Schilfgebiete: 7.3.-10.11., ChS-BP: 0-2	30	1022	20	
083	02610	Kornweihe • <i>Circus cyaneus</i>	regelm., nicht häufiger WiG: 8.9.-1.5., gewöhnl. Okt.-Apr., Schlafgesellschaften im Grabenst. Moos-Schilf	13	442	20	
084	02630	Wiesenweihe • <i>Circus pygargus</i>	BrutG 1976 Grabenst. Moos (G. Hohl, Foto), heute DurchZ + SoG: 10.4.-27.9.,	3	81	17	
085	02670	Habicht • <i>Accipiter gentilis</i>	verbreiteter, nicht häufiger BrutV der Wälder: ganzjährig	2	335	20	
086	02690	Sperber • <i>Accipiter nisus</i>	verbreiteter, mäßig häufiger BrutV der Wälder, jagt auch in Ortschaften: ganzjährig	11	376	20	
087	02870	Mäusebussard • <i>Buteo buteo</i>	verbreiteter, recht häufiger BrutV der Wälder, jagt auf offenen Flächen: ganzjährig	141	351	20	
088	02900	Raufußbussard • <i>Buteo lagopus</i>	seltener WiG: Dez.-Feb., vereinzelt bis April? (Wohl oft mit Mäusebussard verwechselt)	2	38	12	
089	02920	Schreiadler • <i>Aquila pomarina</i>	19.5.1907 SimsS erlegt, 6.5.1950 HB (beide Wüst 1981), 3.9.1960 (Frieling 1961), 25.11.1962 (Schwarzer)	1	4	0	

Ifd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
090	02930	Schelladler • <i>Aquila clanga</i>	Mai 1967 bei Pittenhart gefangen (Präparat von Mebs u.a. bestimmt)	1	1	0	
091	02960	Steinadler • <i>Aquila chrysaetos</i>	BrutV des Gebirges: ganzjährig, kommt selten ins Vorland, im Gebiet 2-3 BP	4	60	13	↑
092	03010	Fischadler • <i>Pandion haliaetus</i>	spärlicher DurchZ/SoG: 12.3.-24.10., Vierer-Gelege 17.5.1876 vom Simssee > Zool. StaatsS. (Wüst 1981)	4	225	20	
093	03040	Turmfalke • <i>Falco tinnunculus</i>	recht häufiger BrutV an Felsen im Gebirge, an/in Gebäuden, jagt auf offenen Flächen: ganzjährig	11	343	20	
094	03070	Rotfußfalke • <i>Falco vespertinus</i>	(fast) regelm. DurchZ aus SO-Europa, 18.4.-15.6. (26.6.) + 26.8.-22.9. (7.10.), Wegzug spärlich	26	225	20	
095	03090	Merlin • <i>Falco columbarius</i>	unregelmäßiger WiG aus N-Europa: 6.9.-26.4. (wegen Ähnlichkeit mit Turmfalke wohl oft übersehen)	2	57	11	
096	03100	Baumfalke • <i>Falco subbuteo</i>	(Frühjahrs-)DurchZ + nicht häufiger BrutV lockerer Gehölze + offener Landschaften: 2.4.-7.10.	18	931	20	
097	03200	Wanderfalke • <i>Falco peregrinus</i>	BrutV im Gebirge, auch im Vorland jagend, %% seit Ende 1980ern: ganzjährig, im Gebiet 10-20 BP	4	346	20	↑
098	03260	Haselhuhn • <i>Bonasia bonasia</i>	verbreiteter BrutV der lockeren Bergwälder: ganzjährig, 1 W am 21.2.1905 in Breitbrunn (W. Dietzen)	5	60	12	
099	03300	Alpenschneehuhn • <i>Lagopus mutus</i>	WiG/BrutV?: 1958 Geigelstein (Wüst 1981), 4.10.1983 Sonntagshorn (MW), 4 Ind. 16.1.1989 Geigelst. (NM)	4	3	1	
100	03320	Birkhuhn • <i>Tetrao tetrix</i>	BrutV im Gebirge: Rz aus Voralpenmooren in 1960ern, 1969 letzte Beob. im GraMo (GH), ganzjährig	18	66	13	↘
101	03350	Auerhuhn • <i>Tetrao urogallus</i>	BrutV im Gebirge: gelegentlich erscheinen einz. Hähne im Vorland, so 25.3.2000 Rottau (ML), ganzjährig	4	30	9	
102	03670	Rebhuhn • <i>Perdix perdix</i>	bis Anfang 1960 wohl BrutV auch südl. ChS, fehlt heute wohl im ganzen Gebiet, Max. = 1939!	18	15	1	(⊕)
103	03700	Wachtel • <i>Coturnix coturnix</i>	regelmäßiger DurchZ (Mai/Juni), spärlicher BrutV der Wiesen, Felder, Moore: 24.4.-4.8., 4 x 25.9.-7.11.	20	191	19	↘ ?
104	03940	Fasan • <i>Phasianus colchicus</i>	im Kulturland verbreiteter, nicht häufiger BrutV: ganzjährig	7	133	18	
105	04070	Wasserralle • <i>Rallus aquaticus</i>	mäßig häufiger BrutV der Uferöhrichte: ganzjährig, im Winter seltener	40	650	20	
106	04080	Tüpfelsumpfhuhn • <i>Porzana porzana</i>	regelm. DurchZ, (etwas unregelm.?) BrutV der Ufervegetation: 23.3.-11.11., bevorzugt obere Alz	6	221	20	
107	04100	Kleines Sumpfhuhn • <i>Porzana parva</i>	seltener DurchZ (BrutV?): 21.4.-27.6. + 14.8.-8.9. (23.10.), Juli-Daten fehlen	2	32	12	
108	04210	Wachtelkönig • <i>Crex crex</i>	DurchZ + selten gewordener BrutV: 4.5.-9.10., ChS-BP: 10-30, Max. = Grabenst.Moos 1962	50	313	20	↘
109	04240	Teichhuhn • <i>Gallinula chloropus</i>	verbreiteter, mäßig häufiger BrutV an Teichen + Seen: ganzjährig, im Winter seltener, ChS-BP: 10-20	25	706	20	

Ifd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
110	04290	Blesshuhn • <i>Fulica atra</i>	verbr., häufiger BrutV an Gewässern + zahlr. WiG (zun.), im So viele Nichtbrüter, ChS-BP: unter 100	19000	1708	20	
111	04330	Kranich • <i>Grus grus</i>	seltener DurchZ: 6.3.-8.5. (25.5.) + 15.9.-16.11. (3 ältere Dez.-Daten)	38	93	14	
112	04380	Mandschurenkranich • <i>Grus japonensis</i>	1 Ind. 17.11.-16.12.2004 (Proske u.a.)	1	5	1	
113	04460	Großtrappe • <i>Otis tarda</i>	Irrgast (aus Gefangenschaft?): 23.4.1936 bei Endorf erlegt (Wüst 1981), 7.2.1987 Simssee (M. Proske u.a.)	1	2	0	
114	04500	Austernfischer • <i>Haematopus ostralegus</i>	seltener Gast von Küsten: 25.3.-21.9. (1 Ind. 1.11.1961); 12 am 27.8.1921, davon 4 erlegt, seither max. 3	3	30	8	
115	04550	Stelzenläufer • <i>Himantopus himantopus</i>	seltener mediterraner Sommergast, erst seit 1994: 10.4.-13.7. (1 Ind. 12.8.2001)	5	28	9	↑
116	04560	Säbelschnäbler • <i>Recurvirostra avosetta</i>	seltener SoG d. Küsten: 1 Ind. 11.4.1964, dann erst wieder ab 1990, 3.4.-10.8 (1 Ind. 1.-2.1.1995, H. Uhlig)	3	27	10	↑
117	04590	Triel • <i>Burhinus oedicephalus</i>	nur alte Daten: je 1 Ind. erlegt Sep. 1929 + Nov. 1939, 5.5.1949 (M. Kiefer), 9.9.1967 (G. Schwarzer)	1	4	0	⊕
118	04650	RF-Brachschwalbe • <i>Glareola pratincola</i>	südl. Irrgast: je 1 Ind. 1.6.1968 (Schwarzer 1968), 20.5.1986 (Kurzmann), 9 Ind. 12.8.1997 (Weinfurter)	9	3	1	
119	04690	Flussregenpfeifer • <i>Charadrius dubius</i>	noch verbreiteter, nicht häufiger BrutV auf Kies + Moor, DurchZ: 12.3.-9.11., ChS-BP (Umgebung): 10-20	29	791	20	↓ ?
120	04700	Sandregenpfeifer • <i>Charadrius hiaticula</i>	DurchZ: 12.3.-10.11., Hauptdurchzug Aug.-Okt., Heimzug schwach (Verwechslungen mit Flussregenpfeifer?)	30	402	20	
121	04770	Seeregenpfeifer • <i>Charadrius alexandrinus</i>	je 1 Ind. 3.10.1970 (Hohlt), 8.9.1991 (Marquart), 21.7.1996 (Unkner), 24.9.1999 + 18.4.2002 (Faas)	1	5	4	
122	04850	Goldregenpfeifer • <i>Pluvialis apricaria</i>	nicht allj. DurchZ aus N-Europa: 26.2.-15.4. + 29.8.-13.12., gern auf überschw. Wiesen, selten in gr. Zahl	34	40	15	
123	04860	Kiebitzregenpfeifer • <i>Pluvialis squatarola</i>	fast alljährlicher DurchZ aus Sibirien, meist einzeln am Seeufer: 1.5.-26.12., Max. Aug. + Sep./Okt.	10	192	18	
124	04930	Kiebitz • <i>Vanellus vanellus</i>	DurchZ + abnehmender BrutV der Felder: in allen Monaten, Max. im März, ChS-BP (nähere Umg.): 15-25	2200	1877	20	↓ ↓
125	04960	Knutt • <i>Calidris canutus</i>	seltener DurchZ aus N-Sibirien: 1 x Apr, 1 x Mai, 1 x Ende Juli, 25 x Aug, 32 x Sep, 4 x Okt (12.4.-19.10.)	11	64	13	
126	04970	Sanderling • <i>Calidris alba</i>	seltener DurchZ aus N-Sibirien: 1 x Apr, 9 x Mai, 11 x Aug, 28 x Sep, 10 x Okt, 1 x Nov (9.4.-16.11.)	4	67	16	
127	05010	Zwergstrandläufer • <i>Calidris minuta</i>	DurchZ aus N-Sibirien: 12 x Mai, 10 x Jun, 11 x Jul, 84 x Aug, 164 x Sept, 57 x Okt, 8 x Nov. (9.5.-17.11.)	50	375	19	
128	05020	Temminckstrandläufer • <i>Calidris temminckii</i>	DurchZ aus N-Europa: 2 x Apr, 10 x Mai, 1 x Jun, 15 x Jul, 45 x Aug, 19 x Sep, 2 x Okt (13.4.-16.10.)	5	95	17	
129	05050	Graubrust-Strandläufer • <i>Calidris fuscicollis</i>	IrrG aus N-Sibirien: 10.-13.9.1962 (Senk 1963), 28.8.-6.9.2003 (Lohmann u.a.), 13.-31.2006 (Masur u.a.)	1	13	2	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
130	05090	Sichelstrandläufer • <i>Calidris ferruginea</i>	DurchZ aus N-Europa: 3 x Apr, 3 x Mai, 1 x Juni, 19 x Juli, 85 x Aug, 87 x Sep, 14 x Okt (11.4.-28.10.)	43	212	19	
131	05100	Meerstrandläufer • <i>Calidris maritima</i>	IrrG aus N-Europa: je 1 Ind. 18.4.1947 (Entfellner, Frieling) + 30.11.2008 (H. Stocker, Belegfotos)	1	2	1	
132	05120	Alpenstrandläufer • <i>Calidris alpina</i>	seltener DurchZ aus N-Europa: 1/Jan, 15/Mrz, 19/Apr, 16/Mai, 4/Juni, 33/Juli, 186/Aug, 261/Sep, 212/Okt, 67/Nov, 7/Dez	100	821	20	
133	05140	Sumpfläufer • <i>Limicola falcinellus</i>	Irrgast aus N-Europa: 1 Ind. 19.5.1950 (Hohlt), Wegzug 12.8.-3.10., 5 x 1959-73, 2 x 1995-2008	2	11	2	
134	05160	Grasläufer • <i>Tryngites subruficollis</i>	Irrgast aus N-Amerika: 18.9.1985 (Trawöger, Kurz), 19.10.1991 (Masur, Lo), 16.9.2006 (Masur)	1	3	2	
135	05170	Kampfläufer • <i>Philomachus pugnax</i>	(fast) regelm. DurchZ: Max. im März/Apr. (größere Zahlen) + Aug./Sep. (geringere Zahlen), fehlt Dez.	400	1030	20	
136	05180	Zwergschnepfe • <i>Lymnocyptes minimus</i>	mäßig häufiger WiG aus NO-Europa: 4.10.-12.3. + 2 x Aug. (leicht zu übersehen + zu verwechseln)	4	35	13	
137	05190	Bekassine • <i>Gallinago gallinago</i>	BrutV + DurchZ, Ufer + Feuchtwiesen: ganzjährig, Max. Sep./Okt., Brutbestand kurz vor dem Erlöschen	109	1459	20	↓ ↓
138	05290	Waldschnepfe • <i>Scolopax rusticola</i>	seltener BrutV + DurchZ, Moore, Au-/Bergwälder: 11.3.-11.12., im Vorland nur wenige Brutnachweise	2	47	15	↓
139	05320	Uferschnepfe • <i>Limosa limosa</i>	(fast) regelm., spärlicher DurchZ der Ufer + Feuchtfelder: 10.3.-24.12., Max. März/Apr. + Aug.	20	188	19	
140	05340	Pfuhschnepfe • <i>Limosa lapponica</i>	spärl. DurchZ (SoG) aus NO-Europa: 12.5.-8.11., Max. im Sep., nur 1990/91 14-16 Ind., sonst höchstens 5	16	87	12	
141	05380	Regenbrachvogel • <i>Numenius phaeopus</i>	spärlicher DurchZ (SoG) aus NO-Europa: 20.3.-27.9., Max. Apr. + Juli/Aug., oft mit Gr. Brachvögeln	21	135	19	
142	05410	Großer Brachvogel • <i>Numenius arquata</i>	zahlreicher SoG + WiG, selten gewordener BrutV (3-6 BP)	360	2347	20	↓ ↓
143	05450	Dunkler Wasserläufer • <i>Tringa erythropus</i>	regelm. DurchZ aus N-Europa: in allen Monaten, Apr./Mai (schwaches Max.) + Aug./Sep. (starkes Max.)	20	486	20	
144	05460	Rotschenkel • <i>Tringa totanus</i>	bis Anfang 1960 BrutV, heute regelm., spärl. DurchZ (SoG): 7.3.-14.10.	14	307	20	+
145	05470	Teichwasserläufer • <i>Tringa stagnatilis</i>	seltener DurchZ aus O-Europa: 10.4.-17.5. + 20.7.-15.8.	2	18	5	
146	05480	Grünschenkel • <i>Tringa nebularia</i>	DurchZ (SG) aus NO-Europa: 5.4.-6.11., kl. Max. Apr., gr. Max. Juli/Aug. (9.-11.1.2001, Holzmann)	50	913	20	↑
147	05510	Kleiner Gelbschenkel • <i>Tringa flavipes</i>	Irrgast aus N-Amerika: 1 Ind. am 11.8.1998 (Weinfurter, Lo u.a.)	1	1	1	
148	05530	Waldwasserläufer • <i>Tringa ochropus</i>	regelm. DurchZ + SoG + WiG: ganzjährig, Max. Aug., möglicherweise gelegentliche Brut	25	594	20	
149	05540	Bruchwasserläufer • <i>Tringa glareola</i>	regelm. DurchZ aus NO-Europa: 30.3.-17.11., kl. Max. Apr./Mai, gr. Max. Juli/Aug.	88	1019	20	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
150	05560	Flussuferläufer • <i>Actitis hypoleucos</i>	seltener BrutV + DurchZ: 7.3.-30.10., Max. Aug., je 1 x Nov., Dez., Jan., 0-3 BP Tiroler Ache	26	920	20	
151	05610	Steinwälzer • <i>Arenaria interpres</i>	seltener DurchZ aus N-Europa: 6.4.-1.6. + 7.8.-29.9. (1 Ind. 10.12.2002, K. Walter)	4	52	15	
152	05640	Odinshühnchen • <i>Phalaropus lobatus</i>	seltener DurchZ aus N-Europa: 11.5.-20.11., v.a. Aug./Sep., fehlt im Juli	1	13	6	
153	05650	Thorshühnchen • <i>Phalaropus fulicarius</i>	arkt. IrrG: 10.11.91, 14.12.97 (beide Weinf.), 2./3.5.04 (Sumper), 13./14.11.07 (Lo), 5.12.08 (Schaber)	1	4	4	
154	05660	Spatelraubmöwe • <i>Stercorarius pomarinus</i>	arkt. IrrG: 27.1.90 (Uhlig), 2.7.95 (Weinf. u.a.), 27.8.02 (Weinf., T. Langenb.) + 4.12.05 (J. Langenb.)	1	4	4	
155	05670	Schmarotzerraubmöwe • <i>Stercorarius parasiticus</i>	seltener Gast aus N-Europa: 4 x Juni, 1 x Juli, 8 x Aug., 16 x Sep., 3 x Okt., 1 x Nov. (Art nicht immer sicher)	2	33	10	
156	05680	Falkenraubmöwe • <i>Stercorarius longicaudus</i>	Irrgast aus N-Europa: 19.6.2001 (J. Frankland), 2 juv. 14.9.2007 (Totfund H. Schaber, Best. Langenberg)	2	2	2	
157	05690	Skua • <i>Stercorarius skua</i>	Irrgast aus N-Europa: 18.9.1966 (Nitsche), 3.6.-7.12.1978 (Zeißl, Hohlt u.a.), 30.6.1999 (Eick, Treiber u.a.)	1	7	1	
158	05750	Schwarzkopfmöwe • <i>Larus melanocephalus</i>	südeurop. Art: in allen Monaten außer Feb., Max. Apr./Mai, mehrfach Brutverdacht	6	142	16	↑
159	05780	Zwergmöwe • <i>Larus minutus</i>	regelm. DurchZ aus NO-Europa: in allen Monaten, Max. Apr./Mai + Aug./Sep. + Nov.	340	789	20	
160	05790	Schwalbenmöwe • <i>Larus sabini</i>	Irrgast aus N-Sibirien: 14.-20.9.97 (Lo), 30.9.01 (Weinfurtnr), 10.-16.8.02 (Günther u.a.), 2.-8.9.04 (Hohn)	2	26	3	
161	05820	Lachmöwe • <i>Larus ridibundus</i>	verbreiteter + häufiger BrutV: ganzjährig, ChS-BP: um 200	4000	1033	20	
162	05850	Dünnschnabelmöwe • <i>Larus genei</i>	Irrgast aus S-Europa: 11.9.1959 (U. Rahne 1960), 17./18.5.1997 (S. Masur u.a.)	1	4	1	
163	05900	Sturmmöwe • <i>Larus canus</i>	regelm. WiG + BrutG (1957 + 1959): in allen Monaten, Max. Dez.-März (Rückgang seit 1997)	343	740	20	
164	05910	Heringsmöwe • <i>Larus fuscus</i>	Vogel nördl. Küsten: in allen Monaten, am häufigsten im Aug., oft langer Aufenthalt	4	378	20	↑
165	05920	Silbermöwe • <i>Larus argentatus</i>	Vogel nördl. Küsten: in allen Monaten außer Juni, v.a. Nov.-März (erst seit 1983 von MittelmeerM untersch.)	25	297	20	
166	05927	Steppenmöwe • <i>Larus (argentatus) cachinnans</i>	nicht häufiger (Wi)Gast aus O-Europa: in allen Monaten, Max. Nov.-Febr. (erst seit 2001 von MM getrennt)	23	97	8	
167	05926	Mittelmeermöwe • <i>Larus (argentatus) michahellis</i>	zahlr. Gast, seit 1987 BrutV: ganzjährig, Max. Juni-Sep. (erst seit 1983 von SilberM untersch.), ChS-BP: 4-6	388	1120	20	↑
168	05990	Eismöwe • <i>Larus hyperboreus</i>	arktischer Irrgast: 31.1.-22.2.1987 (Hohlt, Lo u.a.), 26.12.1989 (Bindl, Faas), 17.-30.3.1990 (Hohlt, Schaber)	1	8	2	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
169	06000	Mantelmöwe • <i>Larus marinus</i>	regelm. WiG aus N-Europa: in allen Monaten außer Aug., Max. Nov.-März	4	312	20	↑
170	06020	Dreizehenmöwe • <i>Rissa tridactyla</i>	nördl. Gast: Jan.-März 1904 + 1907 (erlegt), 1994 (Lo), 1995 (Knoll), 2009 (Wölf) + 27.8.1980 (Proske)	1	8	2	
171	06050	Lachseeschwalbe • <i>Gelochelidon nilotica</i>	seltener DurchZ: Mai-Juli, 1941 (Kiefer), '57 (Lo), '93 (Gulden), '97 (Masur), '05 (Langenb.), '06 (Lo)	2	12	4	
172	06060	Raubseeschwalbe • <i>Sterna caspia</i>	(fast) regelm. DurchZ nördlicher Küsten: 10.4.-1.11., Max. Aug./Sep.	10	165	19	
173	06110	Brandseeschwalbe • <i>Sterna sandvicensis</i>	seltener DurchZ nördl. Küsten: 20.5.-8.8., 1990-2009 in 11 Jahren, Max. Juni/Juli	9	16	10	
174	06150	Fluss-Seeschwalbe • <i>Sterna hirundo</i>	um 1950 bis 50 BP, bis 1985 bis 10 BP, seither nur noch unreglm. + einzeln, 1.4.-1.11. (13.-15.12.1996, Lo)	(100)	582	20	↓ ↓
175	06160	Küstenseeschwalbe • <i>Sterna paradisaea</i>	seltener, einzelner DurchZ der Küste: 29.4. + 12./13.10.2002, 27.5.2006, 3.6.2008, 10.5.-7.6.2009	1	7	4	
176	06240	Zwergseeschwalbe • <i>Sterna albifrons</i>	seltener DurchZ der Küste: 15.5.-8.9., seit 1977 in 14 Jahren	7	17	10	
177	06260	Weißbart-Seeschwalbe • <i>Chlidonias hybridus</i>	fast regelmäßiger, nicht häufiger DurchZ aus S- + O-Europa: 13.4.-4.10, Max. Mai/Juni (Ende Aug.)	20	101	17	
178	06270	Trauerseeschwalbe • <i>Chlidonias niger</i>	regelmäßiger, oft zahlreicher DurchZ v.a. O-Europas: 12.4.-28.10., Max. Mai	600	1050	20	
179	06280	Weißflügel-Seeschwalbe • <i>Chlidonias leucopterus</i>	nicht häufiger DurchZ O-Europas: 14.4.-14.9. (10.11.1989, Bruch)	60	87	16	
180	06340	Trottellumme • <i>Uria aalge</i>	Netzfang dieses reinen Küstenvogels im Okt. 1988 (Minisini), Präparat auf der Fraueninsel	1	1	1	
181	06680	Hohltaube • <i>Columba oenas</i>	regelm. DurchZ und seltener BrutV: 27.2.-30.10., Max. Sep., ChS-BP: 2-x (Bestand? Verbreitung?)	300	218	20	↑ ?
182	06700	Ringeltaube • <i>Columba palumbus</i>	regelm. DurchZ + verbreit. BrutV der Wälder: März-Okt., ausnahmsw. im Winter, im Okt. in gr. Schwärmen	2000	189	20	
183	06840	Türkentaube • <i>Streptopelia decaocto</i>	häufiger + verbreiteter BrutV der Siedlungen: ganzjährig, fehlt im Gebirge	145	47	20	
184	06870	Turteltaube • <i>Streptopelia turtur</i>	seltener DurchZ (SoG?): 25.4.-16.9., diese wärmeliebende Art brütet in Bayern nur nördlich München	6	52	13	
185	07120	Halsbandsittich • <i>Psittacula krameri</i>	je 1 Ind. 2.5.-27.7.2004 (Weinfurter u.a.) + 22.4.-4.9.2005 (F. Fischer u.a.)	1	14	2	
186	07240	Kuckuck • <i>Cuculus canorus</i>	verbreiteter, aber eher spärlicher BrutV: 4.4.-6.10. (Ausnahme 12.3.2007, C. Moning)	10	222	20	↓ ?
187	07350	Schleiereule • <i>Tyto alba</i>	gelegentl. BrutV (1985 + 1992) + wiederholter Gast (Gewölle in Feldscheunen), nächster Brutpl. Tittmoning	5	10	10	
188	07390	Zwergohreule • <i>Otus scops</i>	1-2 Ind. in den Jahren 1996, 2000, 2001 (?), 2002 (Paarung), 2004, 7.5.-21.6.	2	25	5	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
189	07440	Uhu • <i>Bubo bubo</i>	seltener (unregelm.?) BrutV: ganzjährig, Achental 1-2 BP, Luegsteinwand 1 BP (weitere?)	2	31	9	
190	07510	Sperlingskauz • <i>Glaucidium passerinum</i>	im Bergland verbr., nicht häufiger BrutV: ganzjährig, 2003 Gewölle vor Spechöhle KendImF (Langenberg)	2	22	9	
191	07610	Waldkauz • <i>Strix aluco</i>	verbr. BrutV der Wälder: ganzjährig, Max. = Ästlinge	6	107	18	
192	07670	Waldohreule • <i>Asio otus</i>	nicht häufiger BrutV der Tallagen + des Vorlandes (fehlt im Bergland?): ganzjährig, Max. = Schlafplatz	7	80	13	
193	07680	Sumpfohreule • <i>Asio flammeus</i>	bis Anfang 1960er wohl BrutV oder BG, heute sehr seltener Gast	1	11	4	+
194	07700	Raufußkauz • <i>Aegolius funereus</i>	wohl nicht häufiger BrutV der Berge: ganzjährig, Max. = Familie	4	21	8	
195	07780	Ziegenmelker • <i>Caprimulgus europaeus</i>	seltener DurchZ: 4 x Mai, je 1 x Sep. + Okt., 10.9.1993 verletzter Vogel, nach Pflege freigelassen	1	6	1	
196	07950	Mauersegler • <i>Apus apus</i>	verbr., nicht seltener BrutV der Siedlungen: 17.4.-28.9.	700	178	20	
197	07980	Alpensegler • <i>Apus melba</i>	je 1 Ind. 25.8.1952 bei Gstadt (Osche, lt. Wüst 1986), 8.4.2007 Achendelta (Stöver, Weinfurter - Protokoll)	1	2	1	
198	08310	Eisvogel • <i>Alcedo atthis</i>	verbr., nicht häufiger BrutV (fehlt im Bergland?): ganzjährig, Max. = Summe ChS	7	934	20	
199	08400	Bienenfresser • <i>Merops apiaster</i>	seltener SoG aus S-Europa: 29.4.-2.8. (fehlt im Juli)	12	11	7	
200	08410	Blauracke • <i>Coracias garrulus</i>	je 1 Ind 31.5.1958 (Lohmann), 5.6.1965 (Hohlt)	1	2	0	
201	08460	Wiedehopf • <i>Upupa epops</i>	letzte Brut 1960 bei Eggstätt, seither DurchZ: 20.3.-26.5. + 10.8.-28.10. (7.2.1994), Max. = Familie 1960	6	91	18	+
202	08480	Wendehals • <i>Jynx torquilla</i>	letzte Brut um 1975 (seit 2002 Brutverdacht KendImF), sonst unregelm. DurchZ: 3.4.-3.10.	3	73	16	+ ?
203	08550	Grauspecht • <i>Picus canus</i>	verbreiteter, nicht häufiger BrutV, v.a. im Bergland häufiger als Grünspecht: ganzjährig	5	256	20	↓
204	08560	Grünspecht • <i>Picus viridis</i>	noch verbreiteter, aber selten gewordener BrutV, weniger häufig als Grauspecht: ganzjährig	3	191	18	↓
205	08630	Schwarzspecht • <i>Dryocopus martius</i>	verbreiteter, aber nicht häufiger BrutV alter Wälder: ganzjährig	4	206	18	
206	08760	Buntspecht • <i>Dendrocopos major</i>	verbreiteter, relativ häufiger BrutV: ganzjährig	9	80	20	
207	08830	Mittelspecht • <i>Dendrocopos medius</i>	1 Ind. erlegt Mai 1902 (Wüst 1981), weitere Beob. unsicher (die Art fehlt im bayer. Alpenvorland als BrutV)	1	4	0	
208	08840	Weißrückenspecht • <i>Dendrocopos leucotos</i>	seltener BrutV alter Bergwälder: ganzjährig (oft übersehen?)	5	56	17	
209	08870	Kleinspecht • <i>Dendrocopos minor</i>	seltener BrutV der Auwälder: ganzjährig	6	234	20	↓ ?

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
210	08980	Dreizehenspecht • <i>Dendrocopos (Picoides) tridactylus</i>	nicht häufiger BrutV des Berglandes: ganzjährig	3	42	13	
211	09680	Kurzzechenlerche • <i>Calandrella brachydactyla</i>	seit 2004 IrrG (DurchZ?) aus S-Europa: 2006-09 stets im Apr., 16.-25.4. + 1.-6.10. (Langenberg, u.a.)	2	13	4	
212	09740	Heidelerche • <i>Lullula arborea</i>	nicht häufiger DurchZ: 15.-27.3. + 27.9.-17.11.	46	31	8	
213	09760	Feldlerche • <i>Alauda arvensis</i>	seltener gewordener BrutV + DurchZ der Äcker + Wiesen: Max. Feb./März + Okt.	750	327	20	↓ ↓
214	09810	Uferschwalbe • <i>Riparia riparia</i>	einzig (?) Brutkolonie Griesstätt/Inn (um 100 BP), Nahrungsgast am ChS: 19.3.-15.11.	630	163	20	↓
215	09910	Felsenschwalbe • <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Brutkolonie Luegsteinwand/Oberaudorf, sonst wohl nur DurchZ: 8.4.-18.9. (2009 Brut im Achental)	10	13	9	
216	09920	Rauchschwalbe • <i>Hirundo rustica</i>	BrutV der Dörfer + Ställe: 13.3.-3.12. (Ausnahme 9.2.1989)	2000	256	20	↓ ?
217	09950	Rötelschwalbe • <i>Hirundo daurica</i>	IrrG aus S-Europa: 13.3.1986 bei Siegsdorf aufgegriffen (Foto Lohmann), 13.4.2003 am Inn (Mieslinger)	1	2	1	
218	10010	Mehlschwalbe • <i>Delichon urbica</i>	nicht mehr häufiger BrutV der Ortschaften: 17.3.-28.10., meist erst ab Mitte Apr.	1000	81	20	↓
219	10050	Brachpieper • <i>Anthus campestris</i>	seltener DurchZ auf steinigen Äckern: 15.4.-14.5. + 7.-15.9., in Bayern seltener BrutV nördl. d. Donau	3	27	9	
220	10090	Baumpieper • <i>Anthus trivialis</i>	BrutV offener Baumlandschaften: 28.3.-7.10., Max. DurchZ im Mai	25	261	20	↓ ?
221	10110	Wiesenpieper • <i>Anthus pratensis</i>	nicht häufiger BrutV in Hochmoorheiden + DurchZ: in allen Monaten (Max. = Okt.)	750	310	20	↓
222	10120	Rotkehlpieper • <i>Anthus cervinus</i>	hochnordischer, seltener DurchZ: 3.4.-11.5. + 14.9.-16.10.	2	24	8	
223	10140	Bergpieper • <i>Anthus spinoletta</i>	BrutV der Berge, DurchZ + WiG: in allen Monaten, Max. Apr.	100	276	20	
224	10171	Wiesenschafstelze • <i>Motacilla flava flava</i>	DurchZ + unregelm. BrutV kurzrasiger Feuchtwiesen (1979-91): 18.3.-7.11., Max. Apr./(Mai) + (Aug.)/Sep.	150	314	20	
225	10173	Thunberg - Schafstelze • <i>Motacilla thunbergi</i>	die nordskandinavische Rasse wird tritt unregelmäßig als DurchZ auf: 4.4.-21.5.	40	29	11	
226	10174	Masken - Schafstelze • <i>Motacilla feldegg</i>	die SO-europäische Rasse wird in vielen Jahren beobachtet: 16.4.-12.6.	2	17	6	
227	10175	Aschkopf - Schafstelze • <i>Motacilla cinereocapilla</i>	diese in Italien heimische Rasse wird nur ausnahmsweise beob.: 1963-2008 in nur 6 Jahren: 13.4.-14.6.	2	15	2	
228	10176	Spanische Schafstelze • <i>Motacilla iberiae</i>	Vögel dieser Rasse sind sehr selten: 13.4.1963 (Hohlt u.a.), 1996 Schönegart + 5.4.2003 (beide Masur)	1	2	2	
229	10190	Gebirgsstelze • <i>Motacilla cinerea</i>	verbreiteter, nicht häufiger BrutV an Bergbächen + Flüssen: im Winter selten, Max. = Brutbestand/Fließstrecke	10	245	20	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
230	10200	Bachstelze • <i>Motacilla alba</i>	häufiger, verbreiteter BrutV, gern an Gebäuden: im Winter selten, Max. = DurchZ März + Okt.	200	237	20	
231	10480	Seidenschwanz • <i>Bombycilla garrulus</i>	unregelmäßiger WiG, meist in Trupps: 15.11.-1.5.	150	166	11	
232	10500	Wasseramsel • <i>Cinclus cinclus</i>	verbr. BrutV an Bächen + Flüssen: ganzjährig, Max. = 8 BP auf 4 km Traun (Sandner)	16	213	20	
233	10660	Zaunkönig • <i>Troglodytes troglodytes</i>	verbr. BrutV in Wäldern + Gebüsch, auch in Siedlungen: ganzjährig, Max. = GrabenstM (Walter)	12	26	20	
234	10840	Heckenbraunelle • <i>Prunella modularis</i>	verbr. BrutV in Wäldern + Gebüsch: März-Okt., vereinzelt auch im Winter, Max. = Delta-Ost (Faas)	23	97	20	
235	10940	Alpenbraunelle • <i>Prunella collaris</i>	nicht häufiger BrutV höherer Berge: ganzjährig, winters auch im Tal	3	21	8	
236	10990	Rotkehlchen • <i>Erithacus rubecula</i>	verbr. BrutV + DurchZ: in allen Monaten, Max. März/Apr., Max. = Ostufer ChS 3.4.1996 (Bruch)	110	53	20	
237	11040	Nachtigall • <i>Luscinia megarhynchos</i>	unregelm. DurchZ + gelegentlich BrutV: 19.4.-27.7.	3	93	14	
238	11060	Blaukehlchen • <i>Luscinia svecica</i>	regelm., nicht häufiger BrutV dichter feuchter Vegetation: 6.3.-7.11., Max. = singendes Männchen GrabenstM 1990 (Lo)	15	670	20	
239	11210	Hausrotschwanz • <i>Phoenicurus ochruros</i>	verbr. BrutV + DurchZ, Gebäude + Felsen: in allen Monaten, Max. März	35	146	20	
240	11220	Gartenrotschwanz • <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	sehr selten gewordener BrutV alter Baumbestände + DurchZ: 29.3.-23.10., Max. Apr./Mai + Sep.	6	220	20	↓
241	11370	Braunkehlchen • <i>Saxicola rubetra</i>	nicht häufiger BrutV + DurchZ, Extensivwiesen: 23.3.-27.10., Max. Mai + Aug./Sep., Max. = 30 BP BergM	60	600	20	↓
242	11390	Schwarzkehlchen • <i>Saxicola torquata</i>	nicht häufiger BrutV der Moore seit 1985: 3.3.-1.11., Max. = DurchZ 24.3.2007 LachsG (Netz)	26	549	20	↑
243	11460	Steinschmätzer • <i>Oenanthe oenanthe</i>	regelm. DurchZ auf Äckern, (BrutV im Gebirge?): 20.3.-1.6. (24.6./6.7.) + 10.8.-23.10. (18.11.)	32	362	20	
244	11860	Ringdrossel • <i>Turdus torquatus</i>	BrutV im Bergland (+ DurchZ): 28.3.-23.10., je 1-mal Jan., Feb., Nov., Dez.	20	57	13	
245	11870	Amsel • <i>Turdus merula</i>	verbr. + häufiger BrutV der Wälder + Siedlungen: ganzjährig	30	25	20	
246	11980	Wacholderdrossel • <i>Turdus pilaris</i>	mäßig häufiger BrutV in Feldgehölzen + Auwäldern: ganzjährig, fehlt in schneereichen Wintern	1200	175	20	
247	12000	Singdrossel • <i>Turdus philomelos</i>	verbr. BrutV der Wälder (+ Siedlungen): gewöhnlich Mitte Feb.-Okt., etliche Winterbeobachtungen	100	97	20	
248	12010	Rotdrossel • <i>Turdus iliacus</i>	etwas unregelm. DurchZ + WiG: 13.10.-21.4., Max. März/Apr., oft mit Wacholderdrosseln	100	154	20	
249	12020	Misteldrossel • <i>Turdus viscivorus</i>	BrutV in Nadel- + Mischwäldern, v.a. im Bergland: ganzjährig	80	146	20	
250	12260	Zistensänger • <i>Cisticola juncidis</i>	mediterraner IrrG: 18.-26-6-2009 (R. Krause, J. Langenberg u.a.)	1	6	0	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
251	12360	Feldschwirl • <i>Locustella naevia</i>	mäßig häufiger BrutV v.a. in Niedermooren: 5.4.-7.8. (Ausnahme 8.3.2001, Sumper)	15	216	20	↓ ?
252	12370	Schlagschwirl • <i>Locustella fluviatilis</i>	seltener DurchZ, gelegentlich BrutV (?) feuchter (Ufer-)Gebüsche: (30.4.) 11.5.-15.7.,	2	38	7	↓
253	12380	Rohrschwirl • <i>Locustella luscinioides</i>	regelm., nicht häufiger BrutV größerer Schilfbestände: 8.4.-25.7. (27.9., Langenberg), Max. = Herreninsel	13	295	20	
254	12410	Mariskensänger • <i>Acrocephalus melanopogon</i>	südeurop. IrrG (Niedermoore): je 1 Ind. 6.-10.4.2002 + 8.-20.6.2005 (Langenberg u.a.)	1	7	2	
255	12420	Seggenrohrsänger • <i>Acrocephalus paludicola</i>	früher gelegentlicher DurchZ: 28.4.1963 Irsch. Winkl (Frieling), 26.4.1964 Achendelta (Prölss)	1	2	0	↓↓
256	12430	Schilfrohrsänger • <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	nicht sehr häufiger BrutV im Schilf: 11.4.-9.10., Max. = singende Männchen im GrabenstM am 26.5.1992	22	354	20	
257	12500	Sumpfrohrsänger • <i>Acrocephalus palustris</i>	regelm. BrutV in dichter Ufervegetation, auch an Gräben: 29.4.-27.8. (29.9.), selten vor 7.5., Max. wie vor.	24	174	20	
258	12510	Teichrohrsänger • <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	häufigster + weit verbr. Rohrsänger im Schilf: (3.4.) 17.4.-31.10., ChS-BP: 200-300	120	254	20	
259	12530	Drosselrohrsänger • <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	nur am ChS-Nordufer häufigerer BrutV: 16.4.-23.9., ChS-BP: 20-50	30	390	20	
260	12590	Gelbspötter • <i>Hippolais icterina</i>	verbr., aber nicht häufiger BrutV in Laubgehölzen + Gebüschen: 22.4.-8.9. (6.10.)	5	139	20	
261	12600	Orpheusspötter • <i>Hippolais polyglotta</i>	westeurop. IrrG: 11.-15.6.2006 singendes Männchen am Inn bei Pfaffenhofen (F. Fischer u.a., Belege)	1	1	1	
262	12650	Weißbartgrasmücke • <i>Sylvia cantillans</i>	südeurop. IrrG: 1 Männchen 14.-17.4.1995 am Priener Seeufer (Lohmann u.a.)	1	4	1	
263	12740	Klappergrasmücke • <i>Sylvia curruca</i>	nicht häufiger BrutV der Berge, Moore, Ortschaften: (5.4.) 15.4.-3.10., Max. = KMF-Best. 10.6.1998 (Janner)	14	150	20	↓
264	12750	Dorngrasmücke • <i>Sylvia communis</i>	sehr selten gewordener BrutV des Brachlands: 11.4.-4.9. (20.9.), Max. = Sänger im Achendelta 1.7.55 (GH)	10	110	20	↓↓
265	12760	Gartengrasmücke • <i>Sylvia borin</i>	mäßig häufiger BrutV (feuchter) Gebüsche: 16.4.-8.9.	12	80	20	
266	12770	Mönchsgrasmücke • <i>Sylvia atricapilla</i>	verbr. + häufiger BrutV der Wälder, Gebüsche + Gärten: 18.3.-31.10., Max. = Sänger 28.4. auf 4 km Ostufer	80	84	20	
267	13070	Berglaubsänger • <i>Phylloscopus bonelli</i>	nicht häufiger BrutV in lichten, trockenen Bergwäldern + Mooren: 14.4.-30.7. (3.9.)	4	50	15	
268	13080	Waldlaubsänger • <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	nicht häufiger DurchZ + BrutV in Laubwäldern: 14.4.-9.9., Max. = Herrinsel-O 19.5.1997 (Rudolph)	10	144	20	
269	13110	Zilpzalp • <i>Phylloscopus collybita</i>	weit verbr., häufiger BrutV in Laubgehölzen: (11.1., 2.2.) 28.2.-26.12., Max. = Bestand 4 km Ostufer (Bruch)	90	148	20	
270	13120	Fitis • <i>Phylloscopus trochilus</i>	häufiger BrutV feuchter Laubgehölze: 26.3.-26.9., Max. = Bestand 4 km Ostufer (Bruch)	85	119	20	

lfd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
271	13140	Wintergoldhähnchen • <i>Regulus regulus</i>	verbr., mäßig häufiger BrutV der Nadelwälder: ganzjährig, Max. = Durchzug 23.12.2004 (Weber)	60	61	20	
272	13150	Sommergoldhähnchen • <i>Regulus ignicapillus</i>	verbr., mäßig häufiger BrutV in Nadel- + Mischwäldern: 1.3.-30.10 (4 x Dez.), zunehmend ganzjährig	8	50	20	
273	13350	Grauschnäpper • <i>Muscicapa striata</i>	verbr., nicht häufiger BrutV, Waldränder + Gebäude: 24.4.-27.9. (23.10.), Max. = Best. A-Delta 17.5.2002	20	128	20	
274	13430	Zwergschnäpper • <i>Ficedula parva</i>	nicht häufiger BrutV in Bergwäldern: 29.4.-5.8. (13.9.)	4	57	15	
275	13490	Trauerschnäpper • <i>Ficedula hypoleuca</i>	DurchZ + seltener BrutV in Laubgehölzen: 24.3.-28.9. (2.11.), Max. = Durchzug 5.9.2000 (Stephl)	20	188	20	
276	13640	Bartmeise • <i>Panurus biarmicus</i>	seltener Gast im Schilf, erstmals 1991 beobachtet: 11.3.-4.5. + 19.9.-5.11. (1-mal im Juli)	15	13	7	
277	14370	Schwanzmeise • <i>Aegithalos caudatus</i>	nicht häufiger BrutV in lichten Laubgehölzen: ganzjährig, außerhalb d. Brutzeit in kl. Trupps umherstreifend	24	179	20	
278	14400	Sumpfmeise • <i>Parus palustris</i>	verbreiteter, recht häufiger BrutV in Laubgehölzen, auch in Ortschaften: ganzjährig, im Winter am Futterhaus	20	52	20	
279	14420	Weidenmeise • <i>Parus montanus</i>	BrutV in Misch- u. Nadelwäldern v.a. des Berglands, in Auwäldern selten geworden: ganzjährig	20	54	16	↘
280	14540	Haubenmeise • <i>Parus cristatus</i>	BrutV d. Nadelwälder v.a. im Gebirge: ganzjährig	5	55	17	
281	14610	Tannenmeise • <i>Parus ater</i>	verbreiteter BrutV der Nadel- u. Mischwälder, auch in Ortschaften: ganzjährig	50	25	20	
282	14620	Blaumeise • <i>Parus caeruleus</i>	verbreiteter, häufiger BrutV in Laubgehölzen + Ortschaften: ganzjährig, Max. = Herstdurchzug 29.10.	165	30	20	
283	14640	Kohlmeise • <i>Parus major</i>	verbreiteter, sehr häufiger BrutV versch. Lebensräume: ganzjährig, Max. = Wintertrupp	50	28	20	
284	14790	Kleiber • <i>Sitta europaea</i>	verbreiteter, häufiger BrutV der Wälder + Ortschaften: ganzjährig	12	39	20	
285	14820	Mauerläufer • <i>Tichodroma muraria</i>	seltener BrutV alpiner Felsregionen, im Winter auch im Tal	1	27	10	
286	14860	Waldbaumläufer • <i>Certhia familiaris</i>	verbreiteter, nicht seltener BrutV von Wäldern mit Altholz, auch in Bergwäldern: ganzjährig	3	73	15	
287	14870	Gartenbaumläufer • <i>Certhia brachydactyla</i>	verbreiteter, nicht seltener BrutV in Laub- u. Mischwäldern + Ortschaften, kaum im Bergwald: ganzjährig	7	60	14	
288	14900	Beutelmeise • <i>Remiz pendulinus</i>	DurchZ + gelegentlicher BrutV (1977, 1979?, 2002 - Faas) in Ufervegetation: 20.3.-19.11., Max. Sep./Okt.	17	230	20	
289	15080	Pirol • <i>Oriolus oriolus</i>	DurchZ + nicht häufiger BrutV der Auenwälder: 27.4.-16.9.	6	245	20	↓
290	15150	Neuntöter • <i>Lanius collurio</i>	nicht häufiger BrutV sonniger Gebüsche: 16.4.-7.10., hat nach Rückgang wieder leicht zugenommen	30	522	20	

Ifd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
291	15190	Schwarzstirnwürger • <i>Lanius minor</i>	IrrG aus S- u. SO-Europa: 20.6.1958 (Suchantke), 19.-21.5.1995 (Unkner u.a., Fotobeleg)	1	4	1	
292	15200	Raubwürger • <i>Lanius excubitor</i>	BrutV bis etwa 1965, seither WiG: 11.9.-19.5., vereinzelt Juli, Aug., Max. = Familie 1960 (Hohlt)	8	471	20	
293	15230	Rotkopfwürger • <i>Lanius senator</i>	Brutgast: 15.5. + 21.7.1960 (Gugg, Hohlt, I. Müller), Brutversuch (Gelegfund) 1966 bei Rott/Inn (Hohlt)	2	4	0	↓
294	15390	Eichelhäher • <i>Garrulus glandarius</i>	verbreiteter, mäßig häufiger BrutV der Wälder + Gehölze, auch DurchZ: ganzjährig, Max. = Sep.-DurchZ	300	71	20	
295	15490	Elster • <i>Pica pica</i>	verbreiteter BrutV, nicht im Bergland: ganzjährig, Max. = Winterschlafplatz	50	60	20	
296	15570	Tannenhäher • <i>Nucifraga caryocatactes</i>	BrutV im Bergland, im Herbst auch im Tal, auch etwas DurchZ: ganzjährig	7	89	15	
297	15580	Alpendohle • <i>Pyrhocorax graculus</i>	BrutV in kleinen Felskolonien der Berge, im Winter auch im Tal: ganzjährig, Max. = Wintertrupp Achtental	100	30	12	
298	15600	Dohle • <i>Corvus monedula</i>	nicht mehr häufiger BrutV in Kirchtürmen + Baumhöhlen, geringer DurchZ: ganzjährig, Max. = Wi-Schlafges.	800	318	20	↓
299	15630	Saatkrähe • <i>Corvus frugilegus</i>	seltener Wintergast: 10.10.-28.4. (1 x im Mai), Max. Okt. 1936 (Kiefer), 1000 Ind. Feb. 1986 (Lo)	5000	48	8	
300	15670	Rabenkrähe • <i>Corvus corone</i>	häufiger, verbreiteter BrutV der Agrarlandschaft: ganzjährig, Max. = Wi-Schlafplatz	500	128	20	
301	15720	Kolkrabe • <i>Corvus corax</i>	BrutV im Bergland, nur vereinzelt im Vorland: ganzjährig	16	285	20	
302	15820	Star • <i>Sturnus vulgaris</i>	verbreiteter, häufiger BrutV: gewöhnl. Feb.-Nov., in geringer Zahl auch im Winter, Max. = Schlafgesellschaft.	5000	178	20	
303	15840	Rosenstar • <i>Sturnus roseus</i>	Irrgast: 1 ad. erlegt 1986 (Sammlung Biller), 1 juv. 26.8.1995 (Masur u.a., Protokoll)	1	2	1	
304	15910	Haussperling • <i>Passer domesticus</i>	verbreiteter, häufiger (etwas abnehmender?) BrutV der Ortschaften: ganzjährig	80	15	20	
305	15980	Feldsperling • <i>Passer montanus</i>	verbreiteter, mäßig häufiger BrutV der Kulturlandschaft (fehlt im Bergland): ganzjährig, Max. = Herbstschwarm	500	59	20	
306	16360	Buchfink • <i>Fringilla coelebs</i>	weit verbreiteter, sehr häufiger BrutV in Wäldern + Ortschaften, a.d. DurchZ (Okt.) oft in gr. Schwärmen	5000	43	20	
307	16380	Bergfink • <i>Fringilla montifringilla</i>	WiG aus N-Europa, oft in großen Schwärmen (Feb./März 1996): 30.9.-26.4.	2000	234	19	
308	16400	Girlitz • <i>Serinus serinus</i>	nicht häufiger BrutV meist in Ortschaften + Siedlungsnähe: 18.3.-12.11., Max. = Herbsttrupp	10	94	20	
309	16440	Zitronengirlitz • <i>Serinus citrinella</i>	nicht häufiger BrutV im (offenen) Bergland, oft in Schwärmen: in allen Monaten außer Januar	40	80	17	

Ifd.Nr.	EURING-Nr.	Vogelart • lateinischer Name	Status	Max.	Beob.	Häufigk.	Trend
310	16490	Grünfink • <i>Carduelis chloris</i>	verbreiteter, recht häufiger BrutV lichter Laubwälder + Ortschaften, auf dem DZ oft in großen Schwärmen	2000	36	20	
311	16530	Stieglitz • <i>Carduelis carduelis</i>	verbreiteter, nicht seltener BrutV offener Landsch. mit Gehölzen + Ortschaften, im Winter selten	150	130	20	
312	16540	Erlenzeisig • <i>Carduelis spinus</i>	BrutV der (Berg-)Wälder, nur außerhalb der Brutzeit auch in Ortschaften häufig	500	153	20	
313	16600	Bluthänfling • <i>Carduelis cannabina</i>	DurchZ + seltener BrutV oder BrutG: in allen Monaten, Max. = Okt. bei Rosenheim (Langenberg)	100	106	19	
314	16634	Alpen-Birkenzeisig • <i>Carduelis flammea cabaret</i>	BrutV der Hochlagen, Moore + Ortschaften: ganzjährig, Max. = Winterschwärme (darunter auch Polar-B.?)	50	290	20	↑
315	16660	Fichtenkreuzschnabel • <i>Loxia curvirostra</i>	BrutV der Berg(fichten)wälder (gelegentlich auch der Tieflandmoore?): ganzjährig, meist in Trupps	100	110	18	
316	16790	Karmingimpel • <i>Carpodacus erythrinus</i>	BrutV der Flachmoore in geringer Zahl (10-15 BP) seit 1984: (24.4.)12.5.-15.8., Heimat: Asien + O-Europa	12	344	20	✓
317	17100	Gimpel • <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	verbreiteter, nicht häufiger BrutV der (Berg-)Wälder + Ortschaften: ganzjährig, Max. = Wintertrupps	40	113	20	
318	17170	Kernbeißer • <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	nicht häufiger BrutV in Laubgehölzen (Auwäldern) + Ortschaften: ganzjährig, im Winter auch am Futter	120	169	20	
319	18500	Schneeammer • <i>Plectrophenax nivalis</i>	sehr seltener WiG aus N-Europa: seit 1960 nur in 7 Jahren, 9.11.-31.12. (13.3., Proske)	6	14	2	
320	18570	Goldammer • <i>Emberiza citrinella</i>	mäßig häufiger BrutV offener, strukturierter Landschaften: ganzjährig, Max. = Nov.	200	149	20	↓ ?
321	18600	Zippammer • <i>Emberiza cia</i>	IrrG aus S-Europa: 16.4.1995 Hohenaschau (M. Knoll)	1	1	1	
322	18660	Ortolan • <i>Emberiza hortulana</i>	wohl (fast) regelm., aber vermutl. oft übersehener DurchZ, 13 x seit 1969: 16.4.-18.5. + 27.8.-26.9.	12	39	11	
323	18770	Rohrammer • <i>Emberiza schoeniclus</i>	in Röhrichten häufiger BrutV: gewöhnlich März bis Okt./Nov., vereinzelt auch im Winter	114	228	20	
324	18820	Graumammer • <i>Miliaria (Emberiza) calandra</i>	um 1960 vereinzelt Brutverdacht, heute nur seltener Gast: 23.3.-8.7. (je 1 x Aug. + Sep.)	20	37	11	